


de blauwe klauwier

JAARGANG 14 NR 2



DE BLAUWE KLAUWIER is een uitgave van VOGELWERKGROEP "DE KEMPEN", en verschijnt 4 keer per jaar.

LOSSE ABONNEMENTEN zijn verkrijgbaar door storting van f26,50 op girorekening 5859111 ten name van Vogelwerkgroep de Kempen te Eindhoven, onder vermelding van "abonnement Blauwe Klauwier". De portokosten zijn in de prijs inbegrepen.

DE REDACTIE bestaat uit: Jack Bos, Fred Geven, Pierre v.d. Wielen en Jan Wouters.

Het redactie-adres is: De Braken 11, 5541 AC Reusel.

VOGELWERKGROEP "DE KEMPEN" beoogt hoofdzakelijk bezig te zijn met vogelstudie en natuureducatie, in het algemeen gericht op de Kempen. Bovendien om de belangrijkste vogelgebieden te kunnen beschermen en eventueel te beheren. Dit alles ten einde vogels te beschermen en de kennis op het ornithologisch vlak te vergroten. Hiernaast kunnen andere activiteiten plaatsvinden, indien die leiden tot algemene natuurbescherming, natuurbeheer, natuurstudie en natuureducatie.

LIDMAATSCHAP kan men verkrijgen door zich te wenden tot de secretaris: P. Busink, Urkhovenseweg 274, 5641 KN Eindhoven, tel. 040-814970. Het lidmaatschap begint met een proeflidmaatschap van 3 maanden. De contributie bedraagt f45,-- per jaar; studenten betalen f35,-- en gezinsleden f22,50. De contributie kan gestort worden op girorekening 5859111 ten name van Vogelwerkgroep de Kempen te Eindhoven, onder vermelding van "contributie Vogelwerkgroep"

HET POSTADRES van vogelwerkgroep "De Kempen" is dat van de secretaris: P. Busink, Urkhovenseweg 274, 5641 KN Eindhoven, tel. 040-814970.

HET DIA-ARCHIEF wordt beheerd door: Wim de Kroon, Kuikseindseweg 6, 5091 TD Middelbeers, tel. 04244-2329.

ARTIKELN UIT DE BLAUWE KLAUWIER MOGEN WORDEN OVERGENOMEN, NA VOORAF VERKREGEN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, ONDER VERMELDING VAN DE BRON.

RESULTATEN van het BSP. 1987.

In 1987 is begonnen om het BSP (Bijzondere Soorten Projekt) van SOVON, zoals dat al enkele jaren in Nederland liep, te gaan toepassen in ons werkgebied. Er werd besloten om 21 "bijzondere" soorten gebiedsgewijs te gaan inventariseren. Gebieden waar een of meer van deze soorten voorkomen of in de voorbije jaren voorkwamen, werden op kaart gezet. Deze gebieden werden onder de deelnemende leden verdeeld. Men kreeg een kaart van het gebied en een BSP-handleiding.

Aan het eind van het seizoen zou men zelf de gegevens volgens deze handleiding verwerken en inleveren.


Niet alle gebieden zijn even goed onderzocht. Ook zijn sommige gebieden niet door ons gedaan, daar ze al door andere personen werden geïnventariseerd. In tabel 1 zijn de resultaten van 1987 samengevat.

Zeker voor een aanloopjaar is er goed gewerkt en ik wil dan ook iedereen bedanken die er aan mee heeft gewerkt!

TABEL 1: Resultaten van BSP inventarisaties in de Kempen in 1987.

Soort	Onderzochte gebieden	Soort vastgesteld in	Aantal broedparen
Fuut	13	10	25-27
Geoorde Fuut	5	5	30-32
Roerdomp	3	3	3
Bruine Kiekendief	4	1	1
Korhoen	2	2	4 hanen
Porseleinhoen	2	-	-
Kleine Plevier	5	2	5
Watersnip	2	1	2
Tureluur	4	4	14
Zwarte Stern	4	2	41
IJsvogel	4	-	-
Oeverwaluw	5	-	-
Duinpieper	2	-	-
Grauwe Klauwier	1	-	-
Roek	3	3	61
Tapuit	3	2	15-29

PIETER WOUTERS



BIJZONDERE WAARNEMINGEN IN DE KEMPEN 1987

HENK HENDRIKS

Dit overzicht omvat soorten die in opvallende aantallen werden gezien, soorten die in ons werkgebied vrij zelden worden waargenomen, soorten die ook landelijk gezien zeldzaam zijn alsmede enkele broedvogelsoorten.

Fuut. Dit jaar 15 - 18 paar Budel-Dorplein.

Geoorde Fuut. - 1 broedgeval Ringselven, Budel-Dorplein.

In aug. 2 adult en 5 pulli gezien.

- Op 17 april 1 paartje Beuven-Strabrecht.

- 3 paar Vaarvennen.

- Helaas geen gegevens van Landschotse Heide.

Aalscholver. - 5 april 68 exx. over de Flaes, richting noord.

- 12 april 1 ex. Ringselven, 26 april 1 ex. Goorven.

- 27 april waren er 9 exx. aanwezig op het Beuven, Strabrecht.

- Op 7 mei 1 juv. ex. Soerendonk, op 8 mei 2 exx. de Hoort, B.D.

- Op 21 mei 1 ex. Beuven, 22 mei 1 ex. Valkenswaardse visvijvers.

- Op 23 mei vlogen 2 exx. over het Heezerbos, Heeze.

- Op 5 sept. 1 ex. Reuselse Moeren.

- Op 27 sept. vlogen er 21 exx. over de Groote Beerze, Casteren in zuidelijke richting.

- Op 17 okt. 188 exx. over de Flaes z.w. en ong. 100 exx. Strabrecht.

- Op 18 okt. 9 exx. over Veldhoven. Op 20 okt. 33 exx. Strabrecht.

- Op 21 nov. 1 ex. Veldhoven en Eersel.

- Op 1 nov. vloog een groep van ong. 450 exx. over de Groote Heide in zuidelijke richting. Op 2 nov. 80 exx. richting zuid.


Purperreiger. - Op 13 sept. 1 juv. ex. Reuselse Moeren.

Roerdomp. - 1 paar Ringselven, B.D.

- 1 roepend Soerendonk op 7 juni.

- 1 paar Landschotse Heide.

- 1 paar vessemse vennen.



Ooievaar. - Op 24 april 2 exx. overvliegend zuid-west Wasven, Strabrecht.

- Op 13 en 14 aug. 3 exx. in het centrum van Eersel.

- Zwarte Ibis. - Op 20 okt. werd door Piet van Happen een Zwarte Ibis op Strabrechtse Hei waargenomen. De vogel vloog op een 30-tal meters voorbij.
In de avifauna van Noord Brabant (V. Erve en al. 1967) worst slechts 1 waarneming in de Kempen aangegeven.
Dit was op 5 april 1942 bij Nuenen.
- Wilde Zwaan. - Van 26 febr. - 1 april 1 juv. ex. Beuven.
- Op 9 maart werden maar liefst 16 exx. bij Soerendonk gezien.
- Op 4 en 5 dec. 2 adulte exx. Beuven.
- Vanaf 24 dec. 1 adult ex. Beuven.
- Grauwe Gans. - Dit jaar 5 paar Ringselvennen, B.D.
- Op 18 april 16 exx. Budel Dorplein.
- Op 20 okt. 6 exx. overvliegend Strabrecht.
- Op 7 nov. 40 exx. B.D.
- Rietgans. - Op 9 maart ong. 200 exx. in wak, Beuven.
- Kleine Rietgans. - Van 1 jan. - 8 maart 1 ex. omgeving Netersel.
- Kolgars. - Op 8 maart 12 exx. omgeving Netersel.
- Op 22 dec. 10 exx. overvliegend Strabrecht.
- Brandgans. - Ook dit jaar weer een gemengd broedpaar met Grauwe Gans.
- Indische Gans. - Op 27 april 1 ex. Beuven.
- Op 1 febr. 1 ex. Dunse Dijk, Lage Mierde.
- Nijlgans. - Op 11 febr. 6 exx. op weiland, Akert, Geldrop.
- Op 9 maart en 11 april 1 ex. Soerendonk.
- Op 28 maart 7 exx. Goorven.
- Bergeend. - Op 26 april en 28 juni 2 exx. Goorven.
- Op 10 juni 3 exx. Scheidingsven, Strabrecht.
- Op 11 juli 3 exx. Budel Dorplein.
- Op 14 en 17 aug. 3 exx. B.D.
- Casarca. - Op 9 maart en 11 april 1 ex. Soerendonk.



- Smient. - Op 9 maart 2 man. en 2 vr. Soerendonk.
- Op 16 maart hier 1 paartje.
- Op 22 april 1 paartje Beuven.
- Op 30 okt. 1 vr. Platvoetje, Strabrecht.
- Pijlstaart. - Op 16 maart 1 man. Soerendonk.
- Op 26 okt. 1 vr. Platvoetje, Strabrecht.
- Zomertaling. - Op 5 april 2 paar Beuven. Op 17 april hier 3 exx.
- Op 11 april man. Budel-Dorplein.
- Op 22 april 1 paartje Platvoetje, Strabrecht.
- Op 23 juni 1 paartje Beuven.
- Wilde Eend. - Op 26 dec. 3000 - 3500 exx. Goorven.
- Krakeend. - Op 14 april 14 exx. Beuven.
- Op 22 mei 20 exx. Valkenswaardse visvijvers.
- Slobeend. - Op 19 nov. ong. 200 exx. Goorven.
- Tafeleend. - Op 6 maart 206 exx. zandvanger Hanevoet.
- Krooneend. - Op 26 april 1 man. Molenheide.
-
- Grote Zaagbek. - Op 5 febr. 2 vr. op de Dommel, Collse Zegge.
- Op 23 febr. 3 exx. richting zuid Mierlo.
- Nonnetje. - Op 10 jan. 2 vr. Dommel, Hulsterbroek, Geldrop.
- Op 25 febr en 15 maart 1 paartje Hulsterbroek.
- Op 26 febr. 1 man. Beuven.
- Brilduiker. - Op 1 april 3 man. en 8 vr. recreatieplas Someren.
- Visarend. - Opvallend is dat er alleen waarnemingen uit de tweede helft van het jaar zijn binnengekomen.
- 16 aug. 1 adult Ringselven.
- Op 31 aug. 2 exx. rustend op de Loozerhei en 1 ex. zittend in een dode boom bij het Soerendonks Goor.
- Op 4 sept. 1 ex. Strabrecht.
- Op 5 sept. 2 exx. Strabrecht.
- Op 19 sept. 1 juv. ex. Groote Heide.
- Op 16 okt. 1 ex. Strabrecht.



- Rode Wouw.
- Op 18 april 1 ex.n.o. Budel-Dorplein.
 - Op 18 mei 1 ex.Meelakkers,Heeze.
 - Op 20 okt. 1 ex.z.w. Strabrecht.
 - Op 1 nov. 1 ex.Soerendonks Goor.
- Zwarte Wouw.
- Op 30 april 1 ex.n.o. , Strabrecht.
 - Op 12 mei 1 adult jagend boven het Beuven .De vogel vloog later weg in n.o. richting.
 - Op 23 mei 1 ex.Soerendonks Goor.
- Wespendief:
- Op 5 en 22 april 1 ex.Beuven.Op 26 april 2 exx.Goorven.
 - Op 17 mei 1 ex.Groote Heide.Op 28 juni 1 ex.Goorven.
 - Op 2 aug. 1 ex.Budel.Op 6 aug. 4 exx.reuselse Moeren.
 - Op 9 aug. 2 exx.Strabrecht.Op 14 aug. hier 1 ex.
 - Op 21 aug.1 adult B.D.Op 31 aug. werden 5 exx.te Budel Dorplein gezien.(1 groep van 4 exx.)
 - Op 6 sept en 27 sept. 1 ex.Goorven.
 - Op 26 sept. en 19 sept. 1 ex.Strabrecht,1 ex.Groote Heide.
- Ruigpootbuiserd.
- Van 1 - 7 febr. 1 ex.Goorloop.
- Buiserd.
- Op 2 nov. werden 34 exx.(1 groep van 21 exx.) gezien op de Strabrechtse Heide.
- Keizerarend.
- Op 5 april zou er door o.a. Pierre van de Wielen e.a. een 2de jaars vogel zijn waargenomen boven de Bockenrijder. De vogel vloog in de richting van de Flaes. De waarneming is ingezonden naar de C.D.N.A.Dit zou een nieuwe soort voor Nederland betekenen.
- Grauwe Kiekendief.
- Op 17 aug. 1 man.Budel Dorplein.
- Bruine Kiekendief.
- 1 zeker broedgeval Ringselven(2 of meer jongen)
- Slechtvalk.
- Op 21 en 26 okt. 1 vr.Strabrecht.
- Roodpootvalk.
- Van 10 juni t/m 2 juli 1 adult man.omgeving Kranermeer, Strabrecht.
- Smelleken.
- Okt/nov. 1 man.Groote Heide.
 - 17 sept. 1 ex.Landschot.
 - 3 jan. 1 ex.Cartier.

Kwartel.

- Op 29 mei 1 roepend ex. Strabrechtse Dijk, Strabrecht.

Kraanvogel.

- Op 1 april 1 ex.n.o. Strabrecht.
- Op 18 april 2 exx.n.o. Budel-Dorplein.
- Op 7 mei 2 eexx. laag rondvliegend, Soerendonks Goor.
- Op 29 mei 1 ex.t.p. Strabrecht.
- Op 21 okt. ong. 80 exx. overvliegend Budel.
- Op 24 okt. 15 exx. Strabrecht.
- Op 28 okt. een groep van 37 exx.+14 exx. Strabrecht.
- Op 29 okt. 47 exx. overvliegend Eindhoven.
- Op 1 nov. 4 exx. (3 ad.+ 1 juv.) op maisakker langs de Vlaamse weg, Sterksel.
Op dezelfde dag 23 exx. pleisterend Klotvennen, Grootte Heide.

Kleine Plevier.

- 1 broedgeval Soerendonks Goor. (4 juv. gezien)
- 2 broedgevallen Loozerhei, B.D.
- 2 broedgevallen Strabrecht.
- 2 broedgevallen visvijvers Bergeijk. Deze zijn waarschijnlijk verstoord omdat op 6 juni alle vijvers vol water stonden.
- 1 paar opspuiterreintje enkele km. ten oosten van Ekkersweijer.
- Op 30 april 6 exx. Genoenhuis.

Bontbekplevier.

- Op 23 mei 6 exx. Liskes Bergeijk.
- Op 14 aug. 2 exx. en op 17 aug. 3 exx. Loozerhei, B.D.
- Op 18 aug. 16 exx. Loozerhei B.D.
- Op 31 aug. hier 1 ex.
- Op 27 sept. 8 exx. Loozerhei.

Morinelplevier.

- Op 9 mei 1 ex. in de rusthoek, Strabrechtse Heide.
Dit is een zeer zeldzame waarneming in de Kempen.
1 vondst in de vorige eeuw bij Sterksel en 1 waarneming op 23 sept. 1959 bij Someren. (V. Aerle e.al.)

Goudplevier.

- Op 12 okt. s'nachts doortrekkend gehoord, Valkenswaard.
- Op 26 okt. 1 ex. tussen kieviten Platvoetje, Strabrecht.

Zilverplevier.

- Op 25 en 29 mei 1 ex, Beuven.
- Op 27 sept. 1 ex. Loozerhei, B.D.

Kluut.

- Op 16 mei 3 exx. Beuven.
- Op 7 juni 2 exx. Loozerhei, B.D.



Kanoetstrandloper.

- Op 2-14-16 aug. 1 ex.Loozerhei,B.D.
- Op 18 sept. hier ook 1 exx.
- Op 20 sept. 2 exx.Loozerhei,B.D.

Kleine Strandloper.

- Op 18 aug. 1 juv.ex.Loozerhei,B.D.
- Op 11 en 20 sept. 1 resp.2 exx.Loozerhei,B.D.

Krombekstrandloper.

- Op 14 aug. 1 ex.Loozerhei,B.D.
- Op 20 sept. 3 exx.Loozerhei B.D.

Bonte Strandloper.



Kemphaan.

- Op 27 april 1 ex.Beufen.
- Op 2 aug. 6 exx,en op 14 aug. 4 exx.Loozerhei,B.D.
- Op 17 en 18 aug.2 resp.3 exx.Loozerhei,B.D.
- Op 11 en 18 sept. 6 exx.Loozerhei.
- Op 20 sept. 4 exx.en op 27 sept.8 exx.Loozerhei.
- Op 18 april ong.40 exx.Loozerhei,B.D.
- Op 27 april 12 exx.^BBeufen.
- Op 28 april 19 exx.Platvoetje,Strabrecht.
- Op 30 april 14 exx.Geneenhuis,Geldrop.
- Op 7 mei ong. 20 exx.Beufen.
- Op 17 aug. 10 exx.Loozerhei,B.D.

Rosse Grutto.

- Op 21 aug. en op 27 sept. 1 ex.Loozerhei,B.D.

Regenwulp.

- Op 17 april 10 exx.Beufen.
- Op 9 aug. 1 ex.Beufen.

Tureluur.

- 1 paar Ringselvennen,B.D.
- 4-5 paar heide bij Loozerheide,B.D.(n.westzijde)
- 1 mogelijk broedpaar Beufen-Starven.Op 23 mei werden hier 2 baltsende exx.gezien.
- 3-4 paar Peelven (ten zuiden van Strabrecht).
Het betreft hier agrarisch gebied.

Zwarte Ruiter.

- Op 11 sept. 15 exx.Loozerhei,B.D.
- Op 22 okt. 12 exx.Platvoetje,Strabrecht.

Groenpootruiter.

- Op 7 mei 15 exx.Beufen.
- Op 19 aug. 20 exx.Beufen.

- Witgatje. - Op 18 aug. 10 exx. Loozerhei, B.D.
- Bosruiter. - Op 12 mei 7 exx. Beuven.
- Op 17 aug. 10 exx. Loozerhei, B.D.
- Oeverloper. - Op 18 aug. werden er 35-40 exx. geteld op de Loozerhei.
- Grauwe Franjepoot. - Op 14 aug. 2 juv. exx. Loozerhei, B.D.
Voorzover bekend was dit de 3e waarneming van deze soort in de kempen. Op 16-17 aug. 1965 1 ex. op het Goorven en van 3-10 sept. 1980 3 exx. ook op het Goorven (F. Neijts Blauwe Klauwier 1980)
- N.B. Op 14 aug. werden er door Ruud Bouwman maar liefst 18 verschillende soorten steltlopers waargenomen op de Loozerhei en directe omgeving. (een record?)
- Zwartkopmeeuw. - Op 19 april 2 adulte exx. tussen Kokmeeuwen langs de Kruisstraat, Reusel.
- In april werden maximaal 7 adulte vogels gezien in de kokmeeuwenkolonie te Budel-Dorplein.
- Op 21 aug. 1 ex. ruiend naar winterkleed.
- Kleine Mantelmeeuw. - Op 18 aug. ong. 100 exx. en op 21 aug. ong. 150 exx. Op de Loozerhei, B.D.
- Geelpootmeeuw. - Op 18 en 21 aug. 2 adulte en 3 juv. vogels gezien Loozerhei, B.D.
Mij is geen enkele waarneming in Nederland bekend van juveniele Geelpootmeeuwen.
Sinds recente publicaties over juv. kleden in o.a. British Birds van Geelpoot-Zilvermeeuw is de determinatie niet meer zo moeilijk.
- Dwergmeeuw. - Van 18 - 26 april 1 ex. (2e K.J.) Landschot.
- Op 4 mei 1 ex. Loozerhei,
- Op 7 mei 3 exx. (2e k.j.) Soerendonks Goor.
- Stormmeeuw. - 13 tot 15 broedparen Loozerhei en omgeving Ringselvennen.
- Zilvermeeuw. - 1-3 broedparen Loozerhei, omgeving Ringselvennen.

Visdief.

- 4 broedparen Loozerhei, B.D.

Zwarte Stern.

- 1 tot 2 broedparen Witven, Strabrecht.
- 7 mei 23 exx. Soerendonk.
- 7 juni 15 exx. Soerendonk.

Kerkuil.



- Dit jaar broedgeval in Budel.
- Op 19 dec. 1 ex. Gijzenrooi, Geldrop. Het betreft hier een solitair ex., die hier al langer aanwezig is.

Velduil.

- Op 3 november werd 2 keer 1 ex. gezien op de Strabrechtse Heide.

IJsvogel.

- Op 26 maart 1 ex. Hulsterbroek, Geldrop.
- Op 21 juni 1 ex. Platvoetje, Strabrecht.
- Op 8 dec. 1 ex. Eindhovens kanaal, Geldrop.
- Op 14 dec. 1 ex. Collse Zegge.

Hop.

- Op 29 aug. 1 ex. op de Strabrechtse Heide.

Kleine Bonte Specht.

- 1 broedgeval in het Heezerbos, Heeze.
- Op 27 maart 1 ex. Hulsterbroek, Geldrop.

Oeverzwaluw.

- Op 11 en 18 april enkele exx. Budel-Dorplein.
- Op 14 april enkele exx. Beuven.
- Op 12 mei 8 exx. Witven, Strabrecht.

Waterpieper.

- Op 5 mei 1 ex. Beuven.
- Op 16 okt. 1 ex. Beuven.
- Okt/dec. max. 9 exx. Soerendonk.

Duinpieper.

- Op 29 en 30 april 1 ex. Strabrecht.
- Op 21 aug. 5 exx. (4 adulte en 1 juv. ex.) op de Loozerhei, B.D.

Noordse Gele Kwikstaart.


- Op 8 mei 1 vr. Ringselven.

Snor.

- Dit jaar 5 broedparen Budel-Dorplein.
- Op 23 juni 1 zangpost Beuven.

Sprinkhaanrietzanger.

- April/mei 1 zangpost Beuven.

- Rietzanger. - Op 18 april 2 zangposten Budel-Dorplein.
- Op 22 april 2 zangposten Beuven.
- Grote Karekiet. - Op 23 mei en 7 juni 1 zangpost Ringselvennen, B.D.
- Fluiter. - Op 18 mei 8 zangposten Heezerbos, Heeze.
- Op 20 mei 4 zangposten "De Pan", Sterksel.
- Glanskop. - Op 21 febr. 1 ex. de Hertgang, Landgoed "de Utrecht".
- Bonte Vliegenvanger. - Op 1 en 19 mei 1 paartje de Coevering, Geldrop.
- 1 broedgeval "Grote Bos", Geldrop.
- Op 21 sept. 2 exx. Grafven, Strabrecht.
- Beflijster. - Op 24 april 1 man. Strabrecht.
- Grauwe Klauwier. - Op 22 mei 1 paartje op nederlands gebied bij Luijks-
gestel.
- Klapekster. - Jan - half april 2 exx. Cartierheide.
- Op 28 jan. 1 ex. Reusel.
- Op 12 april 1 ex. Groote Heide.
- Op 1 sept. 1 ex. Grijze Steen.
- Op 30 okt. 6 exx. (1 groep van 4) omgeving Beuven.
- Op 17 okt. 1 ex. bij de Flaes.
- Op 21 nov. 1 ex. Goorven.
- 
- Keep. - Op 15 juni 1 zangpost Beuven.
- Europese Kanarie. - Op 31 maart 4 exx. Hanevoet, Veldhoven.
- Op 16 sept. 1 ex. Strabrecht.
- Op 22 okt. 2 exx. Strabrecht.
- Goudvink. - Op 8 febr. 4 mann. Hertgang, De Utrecht.
- Op 18 en 26 april 1 paartje Hertgang.
- Op 17 okt. 1 ex. en op 21 nov. 5 exx. Hertgang.
- Kruisbek. - Gedurende de maand december werden geregeld Kruis-
bekken gehoord en gezien in het Leenderbos.

Barmsijs.

- Gedurende de maanden jan.en febr. geregeld Barm-
sijzen Hulsterbroek, Geldrop.
- Op 31 jan. 2 exx.Hanevoet,Veldhoven.
- Op 1 febr. 29 exx.Wellenseind.
- Op 8 febr. ong. 25 exx.Cartierheide.
- Op 19 febr. 36 exx.Dommelen.
- Op 21 febr. 32 exx.Hertgang,De Utrecht.
- Febr.maart verschillende groepen omgeving Hapert.
Op 7 maart ong. 120 exx.Casterse dijk.

- Op 10 maart 10 exx.Gen.Metsulaan,Eindhoven.
- 19 maart 20 exx.E.kanaal,Eindhoven.
- Op 5 mei 1 ex.Soerendonk.

Frater.

- Op 8 febr. 29 exx.industrieterrein Eersel en
3 exx.op de Cartierheide.

Spreeuw.

- Op 5 april 50.000-100.000 slaappleats Beuven.

Kauw (Soemmeringhi)

- Op 24 dec. 7 exx.zesgehuchten,Geldrop.


Bonte Kraai.

- Op 25 dec.20 exx.Paaldijk,Leenderstrijp.

Als laatste nog een special van Strandleeuwerikwaarnemingen.

Strandleeuwerik.

- de maand januari 11 exx.Steensel.
- 7-20 jan. max.87 eex,de Bus,Reusel.
- 10-17 jan.max.38 exx.Brugse Heide,bij V.waard.
- 19 jan. 42 exx.bij Leende.
- 24 jan. 12 exx.Polvokamp,Riethoven. 27 exx.
de Pielis, zw.van de Weebosch.
- 28 jan. 25 exx.Middelbeers.
- 30 jan. 25 exx. Reusel.
- 1 febr. 5 exx.in groep Veldleeuweriken overvlie-
gend Peelsche Heide,Reusel.26 exx.Hulsel.
- Op 1 febr. ook 30 exx.Leende.
- Op 17 febr. 35 exx.visvijvers Bladel.
Op 17 febr. 25 exx.De Strook,Bladel.
- Op 19 febr. 1 ex.Steensel.



NOG ENKELE NAGEKOMEN WAARNEMINGEN.

- Grote Zaagbek. - Op 31 jan. 5 vr. Hanevoet, Veldhoven.
- Korhaan. - In febr. 18 mann. en 2 vr. Oirschotse Hei.
- Porseleinhoen. - Op 22 mei 1 roepend ex. Strijperheg.
- Velduil. - Op 29 maart 1 ex. Cartier.

Hierbij bedank ik de volgende mensen , die door het inzenden van hun waarnemingen dit overzicht mogelijk maakten.

Pierre v.d.Wielen, Tom Heijnen, Piet van Happen, Marco Bakermans, Erik-Jan Kikkert, Ruud Bouwman. (niemand vergeten?)

Je ziet dat je met waarnemingen van relatief weinig mensen toch een aardig verslag kunt maken. Je kan wel nagaan hoe leuk het wordt als veel meer mensen mee zouden doen. Ik doe dit nu al voor het 8e jaar en wanneer je die 8 versla- naast elkaar legt zijn er toch wel enige conclusies te trekken.


Stel, je wilt weten hoeveel Krombekstrandlopers er jaarlijks in de Kempen gezien worden en in welke maanden vooral, dan hoef je maar even 8 jaar- verslagen door te kijken en je hebt al een redelijke indruk. Het kan geen compleet beeld geven omdat niet iedereen iets instuurt. Van des te meer belang is het dan ook dat iedereen zijn waarnemingskaarten goed invult en inlevert. Dan zal in de toekomst ook het jaaroverzicht veel completer worden.

Henk Hendriks
Groesstraat 5
5662 ET Geldrop.



VOGELS VAN DE STAD

W. D. VEENHUIZEN



BIJZONDERE WAARNEMINGEN STAD EINDHOVEN 1987

Aantal	Soort	Datum	Plaats/bijzonderheden	Waarnemer
1	Rode Wouw	13-02-87	Boschdijk	E. de Ruyter
1	vr. Havik	14-02-87	Transformatorstr. slaat met succes Huismus	Willem V.
1	Havik	08-01-87	Mirabelweg slaat Spreeuw	Guus Nas
1	Sperwer	03-02-87	St. Jansweg	B. v. d. Wijk
1	Torenvalk	04-02-87	Beukenlaan/Strijpsbultje	B. v. d. Wijk
1	Torenvalk	07-03-87	Petrus Dondersstr. ->ZO	B. v. d. Wijk
±35	Rietgans?	03-01-87	Fuutlaan ->W	Willem V.
1	Blauwe Reiger	30-05-87	vijver Oude Gracht	Willem V.
1	Witoogeend	eind-02-87	zandvang Hanevoet	J. de Leeuw
1	Wulp	13-03-87	Kennedylaan in berm	J. Slenders
1	Fuut+2juv.	04-04/30-05-87	park Oude Gracht broedgev.	Willem V
1	Groene Specht	26-02-87	Fransebaan/Lyonhof	P. Maréchal
1	Groene Specht	03-04-87	ts. Dommel/St. Clarain riep	B. v. d. Wijk
1	Groene Specht	06-04-87	Dommelplantsoen roepend	B. v. d. Wijk
1	Zwarte Roodstr.	04-04-87	v. Oldenbarneveldln stil	Willem V.
1	Steenuil	29-02-87	nabij M. E. C.	B. v. d. Wijk
±50	Putter	febr. 87	omgeving Hanevoetplas	Jack Bos
1	Nachtegaal	27/28-04, 07-05-87	H. Dunantpark(N) zang	Guus Nas
1	Nachtegaal	15-05-87	rondweg/clarissenklooster	Willem V.
±100	Barmsijs	17-01-87	tuinen Geestenberg op berk	Willem V
±100	Barmsijs	04-02-87	tuinen Geestenberg	J. Slenders
15	Barmsijs	06-02-87	tuinen St. Jansweg	H. Bierman

EXCURSIE STADSVOGELPROJECTGROEP

Op 7 mei 1988 gingen we met 3(!) fanatieke vogelaars op pad om onze jaarlijkse stads-vogelexcursie te volbrengen.

We vertrokken om 6.00 uur nabij de hoofdingang van het Diaconessenziekenhuis aan de Theodoorstraat en liepen via O.L. Vrouwestraat in noordelijke richting langs de westelijke oever van de Dommel, v. Oldenbarneveldlaan, Karpendonkse Plas, door het villapark Koudenhoven en via het TU-terrein terug naar het ziekenhuis.


In totaal hebben we 40 soorten vogels gezien, de meest interessante soorten zal ik even noemen.

Langs de Dommel Oeverloper (2), Grasmus (1), Nachtegaal (1) en Boomkruiper (2), vanuit het Eckartsebos Groene Specht (1), omgeving Karpendonkse Plas Fuut, 13 ad.+8 juv., villawijk Koudenhoven Grote Bonte Specht (1), Fluitier (1), Matkop (1) en Witte Kwikstaart (1). Op het TU-terrein prachtige Ringmussen.

Jammer dat velen dit moois van zo nabij hebben gemist. Vooral de jong startende vogelkenner had bijna alle soorten beeldvullend in de kijker kunnen hebben en de oorverdovende zang kunnen leren.

Tot ziens tot volgend jaar.

WILLEM VEENHUIZEN



Enkele belevenissen met GIERZWALUWEN

PARENDE GIERZWALUWEN

In mei van dit jaar zag ik in het Bossche Broek twee gierzwaluwen dicht achter elkaar door de lucht scheren. Op een gegeven moment zag ik ze paren. Dat gierzwaluwen alles kunnen in de lucht wist ik wel, maar dit had ik ze nog nooit zien doen.


GIERZWALUW VERDRINKT IN MAAS

Een paar zomers geleden was ik op vakantie in het Maasdal tussen Namen en Dinant. Tijdens het bekijken van een prachtige rotsformatie, die steil uit de Maas oprees, zag ik opeens een gierzwaluw laag over het water vliegen. Eerst leek het erop dat hij even een slokje water dronk en weer opsteeg (dat schijnt wel vaker voor te komen), maar opeens raakten zijn vleugels het water en kon hij niet meer omhoog komen. Na enkele wilde spartelingen bleef de vogel stil liggen en verdween met het snelstromende water uit mijn gezichtsveld.

GIERZWALUW STORT NEER IN DEN BOSCH

Op 17 mei j.l. verliet ik mijn huis om boodschappen te gaan doen. Aan de overkant van de straat lag een gierzwaluw panniekerig te slaan met zijn vleugels, daarbij steeds dichtter de langzoevende auto's naderend. Snel pakte ik de vogel op. Hij sloot zijn korte teentjes enorm stevig om mijn


vingers. Terug thuis probeerde ik hem vanuit onze dakgoot te laten opstijgen, maar dat mislukte. Via het zolderraampje van de burens kon ik hem weer uit de iets lager gelegen dakgoot pakken en ik besloot hem wat rust te gunnen. Ik zette hem in een metalen vogelkooitje. Meteen krom hij tegen de tralies omhoog en bleef zo hangen. Ik pakte papier en pen en ging het papegaaiachtige diertje natekenen. Hij ging slapen dus ik kon rustig tekenen.



Wat mij opviel waren de tenen en de oogleden. De tenen zijn ongeveer even lang als de nagels, zo'n 8 mm., en zowel teen als nagel zijn zwart. Van de ogen viel mij op dat de

vogel eerst een soort vlies van onder naar boven kon schuiven en daar overheen een echt ooglid, dat van boven naar beneden sloot. Is dat normaal of hebben alleen enkele soorten dat?

Na een poosje nam ik de gierzwaluw weer uit het kooitje en zette hem opnieuw in de dakgoot (een poging om hem tegen de muur te zetten mislukte) waar hij onder een kapotte dakpan kroop. Ik kreeg de indruk dat de vogel erg vermoeid was door het gespartel op straat en mogelijk ook door mijn gehannes, dus ik liet hem zitten en ging boodschappen doen.



Toen ik na een uur terugkwam was de gierzwaluw verdwenen. Was hij naar beneden gevallen of na wat rusten weer opgestegen?

Fred Geven.



OPROEP



MEDEWERKING GEVRAAGD VOOR DE HUISZWALUWTELLING IN DE KEMPEN

Dit jaar proberen we zoveel mogelijk dorpen en steden binnen ons werkgebied te onderzoeken op het voorkomen van de Huiszwaluw. Het is de bedoeling om de gehele bebouwde kom te doorzoeken en de bewoonde nesten te noteren (zie toelichting).

Mocht je in het buitengebied toevallig ook nesten vinden dan gaarne deze ook noteren.

De beste telperiode is eind juli begin augustus (zie toelichting).

Tel je eigen stad of dorp en geef dit even door aan mij, opdat er geen plaatsen dubbel geteld worden.

De onderstaande personen hebben hun medewerking al toegezegd:

<u>persoon</u>	<u>plaats</u>
Marco Bakermans	Hapert
Mart. v.d. Broek	Steensel
Piet van Happen	Geldrop+Heeze+Leende
Guus Nas	stuk van Eindhoven+Breugel
Ton v.d. Vleuten	Casteren
Willem Veenhuizen	Eindhoven+
Jan Wouters	Reusel
Wil Beeren	Budel+Maarheeze+Budel-Dorplein

Dit jaar probeer ik zoveel mogelijk mensen te activeren om in geheel Noord Brabant Huiszwaluwen te tellen. -Zegt het voort-.


Een verslag hiervan wordt voorbereid.

Met dank,

Willem D. Veenhuizen
Bussele 32
5641 PB EINDHOVEN
Tel. 040 - 816913

P.S. Een telformulier met toelichting op de achterkant is hiernaast afgedrukt.

TELFORMLIER HUISZWALUW



GEMEENTE/
STAD/DORP/KOLONIE:

TELDATUM :


TELLER(S) :

STRAAT/LOKATIE	nest hoogte in m.	huis- no.	Nestligging					totaal	bezette nesten		BIJZONDERHEDEN*			
			noord	oost	zuid	west	oud		nieuw	nest- lokatie	boven raam	deur		

*Te tellen: eind juli - begin augustus
Te Tellen: succesvolle nesten = in/uit
vliegen ad., jongen aanwezig -
uitwerpselen
muur/bodem

Daklijst : hout/metaal/kunststof/
wit/bruin/naturel

'Gekraakte' nesten door Huismus stuks
Midden neten op achterzijde



NESTLOKATIE

geef aan waar
de nesten zich
in hoofdzaak
bevinden

TOELICHTING TELFORMULIER HUISZWALUW

Om in het veld de gegevens vlot te kunnen noteren en naderhand deze beter te kunnen verwerken is dit uniforme telformulier ontstaan.

Wijze van tellen:

Het is raadzaam om bij het tellen van succesvolle Huiszwaluwnesten in een dorp of stad een stadsplattegrond te gebruiken, systematisch kun je de straten afrijden.

Kijk ook aan de achterzijde van de huizen.

De beste telperiode is tussen 15 juli tot 15 augustus. Een telling in deze periode is voldoende (voorkeur eerste week van augustus).

Wil je twee maal tellen dan 2de/3de week van juli - tweede telling in 4de week van juli, 1ste week van augustus (tussen 1ste en 2de telling moet twee weken zitten in verband met eventuele dubbeltellingen).

Hoogte:

Een aanvullend gegeven is het bepalen van de hoogte vanaf de begane grond tot het nest, geschat in meters.

Nestligging

Bepaal op welke windrichting op (noord-, oost-, zuid- of westzijden) de nestplaats gelegen is.

Oude-/nieuwe nesten

Voorals er voor de eerste maal in een dorp of stad wordt geteld is het leuk om ook een indruk te geven of er veel of weinig oude en versleten nestplaatsen aanwezig zijn, dit geeft enigszins een indruk of er in voorgaande jaren ook Huiszwaluwen aanwezig waren.

Oude "niet bezette" nesten zijn te herkennen aan hun lichte kleur, vaak afgebrokkeld of alleen de rand is nog maar zichtbaar.

Nieuwe, versgebouwde nesten zijn donker gekleurd, geheel gaaf afgebouwd, vaak nemen de zwaluwen het volgend jaar hetzelfde nest, dit wordt dan hersteld of bijgebouwd (plekken licht en donker) =

meer dan 50% licht van kleur is oud nest
meer dan 50% donker van kleur is nieuw nest

BIJZONDERHEDEN

Nestlokatie

Interessant is het om in hoofdzaak aan te geven of de nesten aan de kopse zijde(n), of lange zijde(n) van het huis (of gebouw), gebouwd zijn. Geef dit aan volgens de cijfers 1 t/m 5.

Nestlokatie boven ramen/deuren

Wellicht zijn meer gegevens nodig wanneer de Huiszwaluwen hun nesten boven ramen en deuren bouwen. Misschien is er een voorkeur. Niets noteren = blinde muur.

Dit is vooral belangrijk voor de bewoner van het huis; Algemene beheersmaatregelen 'nestplank' (zie brochure voor f. 2,10 van Stichting Mondiaal Alternatief, in samenwerking met Vogelwerkgroep De Kempen (STADSGROEP)).

Daklijst

Van belang is te noteren (te omcirkelen) tegen wat voor daklijst het nest is gebouwd. Ook kleur vermelden.

'Gekraakte' of in beslag genomen nesten door onder andere Huismus en dergelijke, vermelden in aantallen.

Milieu

Van groot belang is, eventuele veranderingen in de omgeving van het nest, nestplaatsen of de kolonie te noteren b.v. mensen steken de nesten ieder jaar eraf, pas geschilderd, nieuwbouw met geschikte daklijsten in de omgeving, parken of beplantingen verdwenen of aangelegd, water in nabijheid (parkvijvers, sloten, beken, vaarten, kanalen, rivieren) aanwezig.

VERMELD DE AANVULLENDE INFORMATIE OP ACHTERZIJDE VAN HET TELFORMULIER

SAMENVATTEND

Mocht de hoeveelheid van het noteren van de gegevens te veel (zijn) of worden dan graag volstaan met: het noteren van de getelde STAD - teldatum - tel(st)(l)er(es) - STRAAT - HUISNUMMER - NESTLIGGING - DAKLIJST (kleur/materiaal).

Formulieren sturen naar VOGELWERKGROEP DE KEMPEN
STADSGROEP

p/a Willem Veenhuizen,
Bussele 32,
5641 PB Eindhoven

VOOR U GELEZEN.

In Bird Study van juli 1987 staat een gevariëerd geheel van artikelen. Het eerste gaat over een onderzoek van aangespoelde vogels op de Shetland eilanden. Gedurende de jaren 1979-1986 is er elke maand zo'n 50 km. kust afgezocht op aangespoelde vogels. De drie meest gevonden soorten zijn Zeekoet, Noordse Stormvogel en Drieteenmeeuw. Er was een duidelijk seizoensgebonden verloop in de vondsten: de Noordse Stormvogel en de meeuwesoorten vertoonden een piek in de zomermaanden met veel pas uitgevlogen jongen, hoewel er ook meer volwassen beesten aanspoelden dan in de winter. De Zeekoet en de Alk vertoonden een omgekeerd seizoensverloop met een piek in januari en februari. Er was een duidelijk verschil tussen de jaren met in sommige winters een grote sterfte van Alken en Zeekoeten, waarschijnlijk ten gevolge van voedselgebrek. Het aantal olieslachtoffers onder de aangespoelde vogels was ook seizoensafhankelijk: de meeste slachtoffers spoelden aan in de wintermaanden.

Een tweede artikel gaat over het foerageergedrag van de Kuifmees in Schotland in vergelijking tot dat van mogelijk concurrerende vogelsoorten. Daarbij stond de vraag centraal of de Kuifmees door zijn gedrag voedselconcurrentie ondervindt of juist ontloopt. Het foerageren in bomen gebeurt hoofdzakelijk in Grove Den. Daarin zoeken ook Zwarte Mezen en Goudhaantjes hun voedsel en soms wat Pimpelmezen. In de winter zoeken Kuifmezen vooral de wat kleinere dennen op in tegenstelling tot de andere soorten. Het hele jaar door blijkt de Kuifmees

zich meer toe te leggen op de zwaardere delen van de bomen zoals stam en takken. De andere soorten maken veel meer gebruik van de naalden om hun voedsel te zoeken. Ook heide is in de winter een geliefde voedselbron, waar de Kuifmees alleen af en toe een Zwarte Mees tegenkomt.

Het foerageren op de grond door Kuifmezen werd in de winter in een kwart van de gevallen gezien. Ook Pimpelmezen kwamen geregeld op de grond eten maar toch aanzienlijk minder.

Het lijkt er dus op dat de Kuifmees door zijn foerageergedrag voedselconcurrentie voor een groot gedeelte weet te ontlopen

Een volgende bijdrage gaat over het dieet van de Kerkuil in Ierland. Daar is in de zestiger jaren de Rosse Woelmuis geïntroduceerd. Deze heeft zich nu verspreid over het zuidwesten van het land. Men heeft een vergelijking gemaakt van het dieet van Kerkuilen uit het zuidwesten, met Rosse Woelmuizen, met dat van Kerkuilen uit andere delen van Ierland, zonder Rosse Woelmuizen.

Het blijkt dat 90% van het totale prooigewicht bestaat uit knaagdieren. Dat zijn de Bosmuis, Bruine Rat, Huismuis en waar hij voorkomt de Rosse Woelmuis. Dat percentage is onafhankelijk van het al dan niet voorkomen van de Rosse Woelmuis. Als de Rosse Woelmuis voorkomt, worden er vooral minder Bosmuizen gevangen en is het aandeel woelmuizen bijna 20%. De Veldmuis en de Bosspitsmuis, die in Engeland een groot deel van het menu uitmaken, komen in Ierland niet voor.


De vangst van Bruine Rat en Huismuis is onafhankelijk van het voorkomen van de Rosse Woelmuis. Zij worden vooral gegeten in biotopen met bebouwing. Een mooie illustratie van de weerspiegeling van de groei van een stad in de voedselkeuze van de Kerkuil vormt het volgende. Een van de roestplaatsen waar nu braakballen geraapt zijn is ook al eerder onderzocht. Van 1970 tot 1972 nam daar het aandeel van de Bruine Rat toe van 16% tot 27%. In de periode 1981-83 was dat gestegen tot 73% van het prooigewicht. De bebouwing is nu tot vlakbij de roestplaats gekomen en het aantal ratten is blijkbaar navenant gegroeid.

In armere biotopen met weinig knaagdieren worden meer Dwergspitsmuizen, vogels en amfibieën gegeten. Dat gebeurt ook in de seizoenen met een groot aanbod van deze prooisorten. Het blijkt weer eens dat de Kerkuil een soort is die zich aanpast aan het voedselaanbod: de prooi die het meest voor-

komt of het gemakkelijkst gevangen kan worden wordt het meest gegeten.

Uit een onderzoek naar het broedsucces van Wilde Eenden op een Schots loch blijkt dat vrouwtjes met jongen lang niet altijd zichtbaar zijn. Dit bemoeilijkt het doen van betrouwbare tellingen. Door vrouwtjeseenden met een zendertje uit te rusten konden ze steeds gelokaliseerd worden. Daarbij bleek dat vooral in de eerste weken de jonge eendjes zich weinig laten zien, en zoveel mogelijk in de begroeiing blijven. 's Morgens vroeg en 's avonds laat zijn ze nog het meest te zien, maar overdag laten ze zich maar in 15% van de gevallen zien. Als ze een week of drie zijn komen ze wat meer te voorschijn maar dan is ook al driekwart van de jongen dood gegaan. Het zal duidelijk zijn dat tellingen van vrouwtjes met jongen dan ook slechts minimum-aantallen opleveren.

Jan Wouters



VOGELVARIA

KINDERMOORD OP DE DOMMEL

Op een avond in mei ging ik rond 7 uur even de hond uitlaten langs de Dommel. Het stikte er van de soepeenden met jongen. Ik zag opeens dat een vrouwtje soepeend een jong pakte. Die moet even een van de kinderen recht zetten, dacht ik nog en in gedachte zag ik mijn moeder zaliger met de broodplank stevig in haar handen. Maar ho, dit was erger, want toen ze het jong losliet bleef het met zijn kopje onder water en na een paar schokjes dreef het beestje roerloos verder de Dommel

af. Ik was nog niet van de verbazing bekomen of ze pakte er weer een en jawel, ook dit beestje dreef roerloos verder. Vragen: Wie heeft dit ooit meer gezien?

Zouden het haar eigen jongen geweest zijn?

Als het jongen van andere geweest waren waarom zouden die dan niets doen? Er zaten andere eenden met jongen binnen 10 meter.

Wie heeft hierop een antwoord? Graag naar:

Piet van Happen

EKSTER EN TORENVALK BROEDEN VLAK BIJ ELKAAR

Tijdens een bezoek voor het BSP aan een heidegebiedje bij Netersel zag ik in twee dicht bij elkaar staande bomen van een bosje vliegden een nest zitten. Toen ik tegen de eerste boom stampte vloog er een torenvalk van het nest. Even erbij geklommen en gekeken: 4 kleine jongen. Van het tweede nest vloog niets weg nadat ik tegen de boom had gestampt. Toch ook maar even controleren, het was geen moeilijke boom. Wie schetst mijn verbazing toen ook dat nest jongen

bleek te bevatten. Het waren 3 eksters van ± 2 weken oud. De nestbomen stonden minder dan 4 meter uit elkaar. Blijkbaar was dat geen probleem voor de oudervogels. De ekster en torenvalk moeten ongeveer tegelijkertijd begonnen zijn met de eileg, maar wie wie heeft opgezocht is moeilijk uit te maken. Van houtduiven is het bekend dat ze graag nestelen in de buurt van boomvalken. In dit geval lijkt het uit nood geboren.

Jan Wouters



KRAANVOGELS OP DE LANDSCHOTSE HEIDE

Voor onze engelse leden Jim en Sarah zijn sommige soorten, die ze hier zien en die voor ons "gewoon" zijn, heel bijzonder of nieuw. Hier volgt een ooggetuigeverslag van de eerste waarneming van kraanvogels op de Landschot, in het Nederlands!

Wij gaan vaak naar de Landschotse Heide, gewoonlijk op zondag. Het was dus niets bijzonders dat we op een zondag in november daar waren.

De dag begon mistig en stil. We wandelden langzaam langs de weg en alles was rustig. Tussen de bomen konden we goudhaantjes en veel mezen horen, die aan het kwetteren waren. Daarbij zaten ook kuifmezen, die wij alleen kennen van het Abernathy Forest, een oud woud in Schotland. Ook andere vogelsoorten lieten zich zien: op de vennen zaten veel wilde eenden en wintertalingen en allerlei bosvogels waren voedsel aan het zoeken. We verwachtten niets ongewoons, maar we hopen altijd... Aan de rand van het Berkven begon ik het geploegde veld langzaam van links naar rechts af te kijken. In het midden bemerkte ik iets donkers in de mist. Er zaten daar enkele vogels, maar van welke soort? Ik bekeek er een nauwkeurig. Hij was grotendeels grijs, bijna dezelfde kleur als de lucht, en groot. Misschien een blauwe reiger, dacht ik. Maar nee, hij was veel groter en had een zwart-witte kop met een rode kruin. Zijn snavel was kloeker en korter dan die van een reiger en zijn hals leek gestreept, wit achter, zwart voor. Ook had hij veel lange pluimen die zijn korte staart verborgen.

Ik fluissterde tegen Jim: "Kom maar, kijk naar die vogels." (I won't translate what I actually said). Hij was het met mij eens: kraanvogels. Negen stuks stonden er op de akker.

Met onze telescoop konden we

ze duidelijker zien. Wat een mooie vogels! Bijna tien minuten konden we ze bekijken maar plotseling vlogen ze op. Een kraai probeerde ze te verjagen terwijl ze een paar keer rondcirkelden. In de vlucht zagen we de zwarte vleugelpunten en de gestrekte hals, de twee belangrijkste verschillen met de blauwe reiger. Daarna vertrokken ze naar het zuidoosten waarbij ze in V-formatie gingen vliegen.

Toen herinnerde ik me dat ik mijn camera bij had en maakte nog snel drie foto's. Jammer genoeg heb ik nu drie foto's van de lucht boven de Landschotse Heide met negen kleine vlekjes. Maar ik weet wat het zijn en ik zal het niet vergeten.

SARAH KAY



ALBINISTISCHE GRASPIEPER OP DE STRABRECHTSE HEIDE

Op zaterdag 9-4-1988, de trouwdag van Agnes en Fred, werd ik even voordat ik naar de receptie zou gaan, gebeld door Jap Smits. Er zat een vogel op de Strabrechtse Heide die niet in zijn vogelgids stond. Dus telescoop, kijker etc. gepakt en naar de hei. Op de plek aangekomen kregen we hem of haar al vlug in beeld en mijn eerste indruk was dat het een ontsnapte kooivogel was, zo'n bastaardkanarie. Maar toen ik de snavel zag was dat uitgesloten.


Wat zagen wij: een pieperachtige vogel; kop roomwit dus zonder oogstreep; ogen zwart; borst en buik roomwit met op de borst enkele bruine stipjes; rug roomwit evenals de stuit; vleugels en staart

vaalbruin; spitse snavel; kleur van snavel en poten geelachtig; pieperachtige vlucht; geluid die middag niet gehoord; fourageerde tussen de graspiepers en was of leek (door de kleur) groter als de graspiepers; als andere graspiepers opvlogen, drukte hij zich tegen de grond.

De volgende dag heb ik het geluid gehoord en inderdaad: een graspieper; maar dan behoorlijk albinistisch. Later, in mei, werd hij nog volop baltsend gezien ±200 m. westelijk van het Waschven aan de Strabrechtsedijk.

Piet van Happen

P.S. Waar komen al die meldingen van een sneeuwgorst toch vandaan?



LEKKER BADDEREN

Ik wist dat er op een geplagd stuk hei bij het Waschven kleine plevieren zaten. Op 17-4-88 kwam ik daar weer langs. Even kijken, en ja eentje fourageerde er en het leek alsof de ander een paar meter verder op het nest zat. Na ±15 minuten vlogen beide plotse-ling op om zo'n 150 meter verder weer in te vallen. De plek waar hij op het nest had gezeten was maar 30 meter van

het pad af dus maar gauw even gaan kijken. Geen nest te zien maar wel een gaatje in de grond waar mieren in en uit liepen. Mijn conclusie is dat mijnheer of mevrouw een mierenbad had genomen, wat wel meer bij vogels voorkomt. O.a. de groene specht doet het, maar ook de kleine plevier doet het.


Piet van Happen

WIST U DAT...

- Nu ik dit schrijf er al 2 inventarisatieweekenden zijn geweest.
- De opkomst goed is te noemen.
- We ook het weer mee hebben gehad.
- Degenen die niet geweest zijn zeker een ding gemist hebben.
- Ik hiermee bedoel lekker een weekend vrij door de velden fladderen
- We het eerste weekend in gewicht zijn toegenomen (behalve Tom Heijnen).
- Dit te danken is aan de grote kookkunst van Wim Jacobs.
- De V.W.G. met medewerking van Rob Aarts in het bezit is gekomen van een aantal geluidsbandjes.
- De Nachtzwaluw er o.a. prachtig op staat.
- Deze bandjes met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt om te inventariseren.
- De tentoonstelling over vogeltrek steeds duidelijker vorm krijgt.
- Deze tentoonstelling in september in het Leenderbos van start gaat.
- Leden die hand- en spandiensten willen verlenen zich op kunnen geven bij Jacques van Kessel of Piet van Happen.
- Als je dit jaar huiszwaluwen wilt inventariseren je bij Willem Veenhuizen moet zijn.
- De kapcommissie eind september een kap- c.q. maaiweekend houdt.
- Je voor nadere gegevens hierover terecht kunt bij Bob van der Wijk.
- De V.W.G. op 7-8-9 oktober weer zeetrek gaat kijken op Cap Gris Nez.
- Je ook vrienden en kennissen hiervoor kunt uitnodigen.
- Hier de stelregel geldt wie het eerst komt die het eerst maalt.
- Je je nu al op kunt geven bij Albert, Martin, Pierre of Piet.
- Lezingen door de eigen leden dikwijls de interessantste zijn.
- Iedereen bij de discussie dan zijn steentje durft bij te dragen.
- Die discussies veel nieuwe theorieën kunnen opleveren.

Houdoe,

PIET



INHOUD: jaargang 14 no. 2 (1988)

Pieter Wouters	Resultaten van het BSP 1987	1
Henk Hendriks	Bijzondere waarnemingen in de Kempen 1987	2
Willem Veenhuizen	Vogels van de stad Eindhoven	13
Fred Geven	Enkele belevenissen met gierzwaluwen	14
Willem Veenhuizen	Oproep: medewerking gevraagd voor de huiszwaluwtelling in de Kempen	16
Jan Wouters	Voor U gelezen.	19
S. Kay, J. Wouters en P. v. Happen	Vogelvaria.	21
Piet van Happen	Wist U dat...	24

Tekeningen: Fred Geven
Lex Peeters
Willem Veenhuizen
Marco Bakermans (voorpagina)