


Broedvogels van de Visvijvers te Valkenswaard

door Jan Kolsters

*analyse van drie inventarisaties
van schaarse en zeldzame
broedvogels in 1991-1999*



Het gebied



moeras



water



loofbos



naaldbos



weiland



droge heide




vergraste heide met veel
opslag van jonge bomen





gagelstruweel





akker




























Resultaten inventarisatie

Dodaars



Knobbelzwaan



1991



1993



1996



1999



Roerdomp



1991



1993



1996



1999



Waterral



1991



1993




1996




1999



Blauwborst




Gekraagde Roodstaart



Kleine Karekiet 1999



Zwarte Mees



Analyse

Ecologische vogelgroepen:


Soorten die ongeveer dezelfde eisen stellen aan hun leefomgeving

Vogelgemeenschap:

Karakteristieke combinatie van vogelsoorten voor een bepaald terreintype

voorbeeld

vogelgemeenschap eiken-beukenbos



Kenmerkendheid

karakteristieke soorten

(zwaar loofhout)

Boomklever

begeleidende soorten

Koolmees

overige soorten

Boompieper

Veeleisendheid

**weinig
kritisch**

→

vrij kritisch

→

kritisch

→

**zeer
kritisch**

→

**zeer kritisch/
uitgestorven**

Vink
Meerkoet
Fitis

Grutto
Geelgors
Boomklever

Zwarte Stern
Nachtzwaluw

Woudaapje
Korhoen


Zeearend
Goudplevier
Kraanvogel

Zeldzaamheid

landelijk

regionaal

Referentiegebieden



**referentie
natte heide
voor nederland**



Dodaars



Geoorde fuut

Dodaars groep

Wintertaling



Zwarte stern



Watervogels

Dodaars groep

Dodaars
Geoorde Fuut
Wintertaling
Zwarte Stern

Slobeend groep

Roodhalsfuut
Grauwe Gans
Smient
Krakeend
Pijlstaart
Zomertaling
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kokmeeuw
Visdief
IJsvogel

Kuifeend groep

Fuut
Knobbelzwaan
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Mandarijneend
Wilde eend
Kuifeend
Meerkoet


**Voedselarm tot
matig voedselrijk
open water**

**Kleinschalig, ondiep
(matig) voedselrijk
open water**

**Voedselrijk
open water**

Watervogels 1991


Dodaars groep



Kuifeend groep Slobeend groep

Aantal soorten


Dodaars groep







Kuifeend groep Slobeend groep

Dichtheid

Watervogels



Watervogels




Dichtheid


Rietvogels

Roerdomp- groep	Rietzanger- groep	Porseleinhoen- groep	Blauwborst- groep	Rietgors- groep
<i>Roerdomp</i>	<i>Bruine Kiekendief</i>	<i>Porseleinhoen</i>	<i>Blauwborst</i>	<i>Blauwborst</i>
<i>Woudaapje</i>	<i>Waterral</i>	<i>Klein Waterhoen</i>	<i>Sprinkhaanzanger</i>	<i>Paapje</i>
<i>Grote Zilverreiger</i>	<i>Kraanvogel</i>	<i>Kleinst Waterhoen</i>	<i>Krekelzanger</i>	<i>Sprinkhaanzanger</i>
<i>Purperreiger</i>	<i>Rietzanger</i>	<i>Kwartelkoning</i>		<i>Krekelzanger</i>
<i>Lepelaar</i>	<i>Rietgors</i>	<i>Waterhoen</i>		<i>Rietgors</i>
<i>Snor</i>		<i>Watersnip</i>		
<i>Kleine Karekiet</i>		<i>Waterrietzanger</i>		
<i>Grote Karekiet</i>				
<i>Baardmannetje</i>				
Nat, voornamelijk overjarig riet	Zegge-riet nat tot verlandend vnl.overjarig	Natte lage vegetaties, ondiep water	Verland riet met struikopslag	Ruigtes en lage struwelen nat tot vochtig

Rietvogels



Aantal soorten




Dichtheid

Watervogels


kenmerkende (vrij) kritische soorten

index



Rietvogels


index



Bosvogels

kenmerkende (vrij) kritische soorten

index



Bosvogels




1991
n=12



1993
n=15



1996
n=16



1999
n=37

einde lezing